UNDERSØGELSE/BEHANDLING

UNDERSØGELSEN SKAL FØRE TIL

UNDERSØGELSE/BEHANDLING

StorJournal: Parodontal status
Klinisk fæsteniveau, pochemål, BOP, furkaturinvolvering, mobilitet

- Diagnoser og prognoser
- Behandlingsplan
- Information og Samtykke
- Inddeling i behandlingskategori

Supragingival scaling (fjernelse af alt synlig plak og tandsten)
Information, udlevering af info-papir, motivation, plak%, instruktion, supragingival scaling

1 eller 2 mundhygiejnekontroller
(ugentligt efter supragingival scaling)
Plak% og reinstruktion

Baseline (3-4 uger efter supragingival scaling)
- *Plak%, pochemål, BOP, furkaturinvolvering, analyse af evt. rtg.*
- Detaljeret behandlingsplan med mål og samtykke
- Sammenligning med pochemål fra StorJournal

Detaljeret behandlingsplan med mål:
BOP ≤ 15%, PD < 5 mm

Subgingival scaling (uanset plak%)
- Plak% ved hvert besøg
- Scaling af alle sites med BOP
- Fin-scaling i PD ≥ 5 mm med CAL ≥ 2 mm (+ inj.)

(et eller flere besøg)

Revurdering af initial fase
(1-2 mdr. efter subgingival scaling)
Plak%, pochemål, BOP, furkaturinvolvering, revideret behandlingsplan (se vejl. "Behandlingsforløb").
FK-lærer godkender revurderingen
APA/UPA/kategori godkendes herefter af Dorte/Morten

Revurdering ud fra behandlingsmål

Mål ikke nået:
BOP > 15%
Sites med:
PD ≥ 5 mm + BOP

Mål nået:
BOP ≤ 15%
PD < 5 mm

SPT (vedligeholdelsesbehandling)
I alt 4 besøg på ca. 1 år med 3 mdr. intervaller. Der måles ved:
- **1. besøg SPT:** *Plak%, CAL, PD, BOP, FUR*
- **2. og 3. besøg SPT:** Plak%, PD, BOP
- **4. besøg SPT:** *Plak%, CAL, PD, BOP, FUR*

Ved 4. besøg laves revurdering og pt. udskrives for PA-beh.

Kritisk vurdering:
Hvorfor er målene ikke nået?

PA-kirurgi (Korrektiv fase) ved god mundhygiejne
Evt. gentagelse af fin-scaling af udvalgte sites

Ved manglende kooperation:
Søg sparring (se vejledning om behandlingsforløb)
eller
SPT af det opnåede resultat i 1 år

1 post-op kontrol pr. uge i 3 uger
Herefter:
Gentagne mundhygiejnekontroller efter behov

Revurdering af korrektiv fase
≥ 3 mdr. efter kirurgi
Plak%, pochemål, BOP, furkaturinvolvering

Revurdering ud fra behandlingsmål

Mål ikke nået:
BOP > 15%
Sites med:
PD ≥ 5 mm + BOP

Mål nået:
BOP ≤ 15%
PD < 5 mm

SPT (se ovenfor)

Kritisk vurdering:
Hvorfor er målene ikke nået?

Overvej: SPT af det opnåede resultat

Farvekoder:
= Undersøgelse
= Kliniske overvejelser
= Behandling